

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:	Код ЛПУ:	

ТЕСТ АКТИВАЦИИ БАЗОФИЛОВ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кровь с ЭДТА
------------------	--------------	-------------------------------

Параметр	Результат	Референсные значения
Фоновая активация базофилов в периферической крови, %	0.5	0.0-5.0
Активация базофилов, стимулированная антителами к Ig E-рецептору FcεR1 (иммунологический путь), %	82.3	>10.0
Активация базофилов, стимулированная fMLP (неиммунологический путь), %	65.2	>10.0
Местноанестезирующие средства		
Активация базофилов после инкубации с Бупивакаином, %	0.5	0.0-5.0
Индекс активации базофилов Бупивакаином	1.0	<2.0
Результат исследования активации базофилов Бупивакаином	Отрицательный	Отрицательный

***Комментарий:** Определение активации базофилов под действием аллергенов в пробе крови не позволяет моделировать абсолютно все процессы, происходящие в организме человека при взаимодействии клеточных и гуморальных факторов. Отрицательный результат активации базофилов свидетельствует о низкой вероятности развития реакции на введение данного аллергена in vivo, однако полностью ее не исключает.

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.

Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:

ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402), действителен до 30.05.2025 г.)

ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.246, действителен до 19.08.2027 г.)

ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал:

 подпись