

Наименование направляющего учреждения

Код направляющего учреждения

Фамилия пациента

Имя пациента

Отчество пациента

Пол пациента

☐ Мужской ☐ Женский

Дата рождения пациента

ДД – ММ – ГГ ГГ

Контактный телефон пациента ☐ ; врача ☐

Беременность

☐ Да ☐ Нет

Срок беременности

☐ Недель

День цикла

Менопауза

☐ лет

Время взятия образца

ЧЧ – ММ

Дата взятия образца

ДД – ММ – 202Г

Диагноз

Фамилия врача

И.О. врача

Код пациента

Внимание! Взятие крови для программ 300076, 300077, 300078 проводится после измерения уровня глюкозы в капиллярной крови натошак, при значении более 7,0 ммоль/л тест не проводится. Укажите уровень глюкозы в капиллярной крови натошак , ммоль/л.

Внимание! Для выполнения исследования необходимо обязательное присутствие всех указанных образцов. При взятии крови соблюдайте следующую последовательность заполнения пробирок: 1. Кровь (сыворотка). 2. Кровь с ЭДТА. 3. Кровь с флюоридом натрия.

ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА		☐ СИТО	☐ приоритет обычный
Вакуумная пробирка с флюоридом натрия ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 1 из 2 Вакуумная пробирка с флюоридом натрия ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 2 из 2	☐ 300076 Пероральный глюкозотолерантный тест КРОВЬ с ФЛЮОРИДОМ НАТРИЯ Глюкоза (натошак) КРОВЬ с ФЛЮОРИДОМ НАТРИЯ Глюкоза (через 2 часа после нагрузки)	Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 1 из 4 Вакуумная пробирка с флюоридом натрия ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 2 из 4	☐ 300078 Пероральный глюкозотолерантный тест (расширенный) КРОВЬ (СЫВОРОТКА) С-пептид (натошак) КРОВЬ с ФЛЮОРИДОМ НАТРИЯ Глюкоза (натошак) КРОВЬ (СЫВОРОТКА) С-пептид (через 2 часа после нагрузки) КРОВЬ с ФЛЮОРИДОМ НАТРИЯ Глюкоза (через 2 часа после нагрузки)
Вакуумная пробирка с флюоридом натрия ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 1 из 3 Вакуумная пробирка с флюоридом натрия ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 2 из 3 Вакуумная пробирка с флюоридом натрия ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 3 из 3	☐ 300077 Пероральный глюкозотолерантный тест (24-28 недель беременности) КРОВЬ с ФЛЮОРИДОМ НАТРИЯ Глюкоза (натошак) КРОВЬ с ФЛЮОРИДОМ НАТРИЯ Глюкоза (через 1 час после нагрузки) КРОВЬ с ФЛЮОРИДОМ НАТРИЯ Глюкоза (через 2 часа после нагрузки)	Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 3 из 4 Вакуумная пробирка с флюоридом натрия ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 4 из 4	приоритет обычный ☐ 300087 Постприанальная глюкоза (через 2 часа после еды) КРОВЬ с ФЛЮОРИДОМ НАТРИЯ Глюкоза (через 2 часа после еды)
	Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ 	приоритет обычный ☐ 300082 Дифференциальная диагностика форм сахарного диабета ЗАМОРОЖЕННАЯ СЫВОРОТКА ** Инсулин С-пептид АТ к β-клеткам поджелудочной железы (п.кол.)	

На направительном бланке указаны преаналитические требования с условиями хранения образцов до 24 часов, подробнее в Приложении №2.
Для всех образцов кровь (сыворотка) рекомендуется центрифугировать пробирку после формирования фибринового сгустка, но не позднее двух часов после взятия крови (2000 g – 10 минут при T=+18+25 °C). Хранить при T=+2 +8 °C в первичной пробирке.
**Сразу после центрифугирования перенести сыворотку в пробирку с крышечкой-пробкой (без наполнителя) и сразу заморозить при T=-20 °C. Доставить в замороженном виде.

ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА

☐ СИТО☐ приоритет
обычный

Вакуумная пробирка с ЭДТА ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 1 из 2 Вакуумная пробирка с флюоридом натрия ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 2 из 2	☐ 300079 Сахарный диабет – контроль лечения (ежеквартальный) КРОВЬ с ЭДТА Гликозилированный гемоглобин КРОВЬ с ФЛЮОРИДОМ НАТРИЯ Глюкоза (натощак)	Окружность талии см Артериальное давление / мм рт. ст. Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 1 из 2 Вакуумная пробирка с флюоридом натрия ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 2 из 2	☐ 300085 Метаболический синдром – первичная диагностика (с 18 лет) КРОВЬ (СЫВОРОТКА) Холестерин Холестерин-ЛПВП Холестерин-ЛПНП Триглицериды КРОВЬ с ФЛЮОРИДОМ НАТРИЯ Глюкоза (натощак)
Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 1 из 2 Вакуумная пробирка с флюоридом натрия ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 2 из 2	☐ 300083 Инсулинорезистентность ЗАМОРОЖЕННАЯ СЫВОРОТКА ** Инсулин Индекс НОМА КРОВЬ с ФЛЮОРИДОМ НАТРИЯ Глюкоза (натощак)	Окружность талии см Артериальное давление / мм рт. ст. Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 1 из 2 Вакуумная пробирка с флюоридом натрия ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 2 из 2	☐ 300086 Метаболический синдром – у детей и подростков первичная диагностика (10-17 лет) КРОВЬ (СЫВОРОТКА) Холестерин Холестерин-ЛПВП Холестерин-ЛПНП Триглицериды КРОВЬ с ФЛЮОРИДОМ НАТРИЯ Глюкоза (натощак)
приоритет обычный Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 1 из 4 Вакуумная пробирка с ЭДТА ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 2 из 4 Вакуумная пробирка с флюоридом натрия ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 3 из 4 Контейнер пластиковый универсальный ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 4 из 4	☐ 300080 Сахарный диабет – контроль лечения (ежегодный) часть 1 КРОВЬ (СЫВОРОТКА) Общий белок Триглицериды Na+/K+/Cl- АСТ Холестерин-ЛПВП Билирубин общий Мочевина АЛТ Холестерин-ЛПНП Креатинин КРОВЬ с ЭДТА Гликозилированный гемоглобин Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формой КРОВЬ с ФЛЮОРИДОМ НАТРИЯ Глюкоза (натощак) Указать суточный диурез мл МОЧА (СУТОЧНАЯ) Проба Реберга Альбумин (микроальбумин)	приоритет обычный Окружность талии см Артериальное давление / мм рт. ст. Вакуумная пробирка с разделительным гелем ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 1 из 3 Вакуумная пробирка с ЭДТА ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 2 из 3 Вакуумная пробирка с флюоридом натрия ШТРИХКОД ПРОБЫ Образец № 3 из 3	☐ 300084 Лишний вес (с 18 лет) ЗАМОРОЖЕННАЯ СЫВОРОТКА ** Холестерин Холестерин-ЛПВП Холестерин-ЛПНП Триглицериды С-пептид Инсулин Индекс НОМА С-реактивный белок (высо-кочув.) Лептин Кортизол ТТГ КРОВЬ с ЭДТА Гликозилированный гемоглобин КРОВЬ с ФЛЮОРИДОМ НАТРИЯ Глюкоза (натощак)
Вакуумная пробирка со стабилизатором ШТРИХКОД ПРОБЫ	☐ 300081 Сахарный диабет - контроль лечения (ежегодный) часть 2 МОЧА Общий анализ мочи Альбумин (микроальбумин)		

На направительном бланке указаны преаналитические требования с условиями хранения образцов до 24 часов, подробнее в Приложении №2.
Для всех образцов крови (сыворотка) рекомендуется центрифугировать пробирку после формирования фибринового сгустка, но не позднее двух часов после взятия крови (2000 g – 10 минут при T=+18+25 °C). Хранить при T=+2 +8 °C в первичной пробирке.

**Сразу после центрифугирования перенести сыворотку в пробирку с крышечкой-пробкой (без наполнителя) и сразу заморозить при T=-20 °C. Доставить в замороженном виде.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЗАКАЗАННЫХ АНАЛИЗОВ Бланк заказа заполняется только печатными буквами
черной или синей ручкой!☒ Выбрать
☐ Отменить

ZD05